

مقایسه اثربخشی روان‌نمایشگری و درمان شناختی رفتاری گروهی بر ترس از ارزیابی منفی، توجه متمرکز بر خود و خود انتقادی در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی

Comparison of the Effectiveness of Psychodrama and Group Cognitive Behavioral Therapy on Fear of Negative Evaluation, Focused Attention and Self-Criticism in Students with Social Anxiety

Mehdi Bakaeian MSc

Mustafa Bolghan-Abadi PhD[✉]

Seyyed Mohsen Asgharinekah PhD

Zahra Bagherzadehgolmakan PhD

مهندی بکائیان^۱

مصطفی بلقان آبادی^۱

سید محسن اصغری نکاح^۲

زهره باقر زاده گلمکانی^۱

Abstract

The aim of this study was to compare the effectiveness of group cognitive behavioral therapy and psychodrama on reducing cognitive symptoms of social anxiety. This research is a quasi-experimental pretest-posttest design with a control group. In this study, 60 students who met the criteria of social anxiety were randomly divided into three groups of 20, including two experimental groups and a control group. All three groups were assessed with Social Anxiety Questionnaire of Connor (2000), Fear of Negative Evaluation Scale-Brief Form of Leary (1983), Focus of Attention Questionnaire of Woody & et al (1997) and Levels of Self-Criticism Scale of Thompson & Zuroff (2004). After 12 sessions of 2 hours of cognitive-behavioral group therapy and psychodrama intervention separately in the experimental groups and nonintervention in the control group, Cognitive variables were assessed again. Findings showed that cognitive-behavioral intervention and psychodrama both significantly reduced the fear of negative evaluation, self-focused attention and self-Criticism in experimental groups compared to the control group. This difference was not significant between the experimental groups. The results showed that both methods are effective in reducing cognitive symptoms of social anxiety and can be used alternatively and depending on conditions should be used in different groups, including students.

Keywords: Social anxiety, Cognitive behavioral therapy, Psychodrama, Fear of negative evaluation, Focused attention, Self-criticism.

چکیده

هدف از پژوهش مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و روان‌نمایشگری بر کاهش نشانه‌های شناختی اضطراب اجتماعی است. پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. در این تحقیق ۶۰ دانشجوی دارای معیار اضطراب اجتماعی، به عنوان نمونه‌های پژوهش در سه گروه ۲۰ نفره؛ دو گروه آزمایش و گروه کنترل بصورت تصادفی تقسیم شدند. گروه‌ها با پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور (۲۰۰۰)، فرم کوتاه پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی لری (۱۹۸۳)، پرسشنامه کانون توجه وودی و همکاران (۱۹۹۷) و پرسشنامه سطوح خود انتقادی تامسون و زوروف (۲۰۰۴) مورد سنجش قرار گرفتند. پس از ۱۲ جلسه ۲ ساعته مداخله شناختی رفتاری و روان‌نمایشگری بصورت جداگانه در گروه‌های آزمایش، مجدداً متغیرهای شناختی فوق مورد سنجش قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد هر دو مداخله باعث کاهش معناداری در ترس از ارزیابی منفی، توجه متمرکز بر خود و خود انتقادی در گروه‌های آزمایش می‌شوند. این تفاوت بین گروه‌های آزمون معنادار ظاهر نشد. نتیجه نشان داد هر دو روش در کاهش نشانه‌های شناختی اضطراب اجتماعی مؤثرند و می‌توانند بصورت جایگزین و بسته به شرایط در دانشجویان مورد استفاده قرار گیرند.

واژه‌های کلیدی: اضطراب اجتماعی، درمان شناختی رفتاری، روان‌نمایشگری، ترس از ارزیابی منفی، توجه متمرکز بر خود، خود انتقادی.

دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۲/۱۸ تصویب نهایی: ۱۴۰۰/۴/۶

۱. گروه روانشناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

۲. گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

• مقدمه

اضطراب اجتماعی یکی از شایعترین و مقاوم‌ترین اختلال‌های اضطرابی در گروه اختلال‌های اضطرابی است، شیوع مادام‌العمر آن را ۱۳ درصد گزارش می‌کنند (کسلرو و همکاران، ۲۰۱۲). این اختلال سومین اختلال روانی و شایع‌ترین اختلال اضطرابی است (منس و همکاران، ۲۰۱۱). این اختلال با انواع فوبیا، افسردگی شدید، اختلال اضطراب متشر و سوء مصرف مواد هم‌آیندی پیشتری دارد (باتلر و همکاران، ۲۰۲۱).

اختلال اضطراب اجتماعی یکی از دلائل شایع مراجعه به مراکز مشاوره است. این اختلال در دامنه سنی ۲۹ تا ۱۸ سال شیوع بالایی دارد (رگرام و ماتیاس، ۲۰۱۴). در این اختلال، ترس در مورد یک یا چند موقعیت اجتماعی است. فرد بیم دارد طوری عمل کند تا نشانه‌های اضطراب را بروز دهد. بنابراین از این موقعیتها اجتناب شده، یا با ترس و اضطراب شدید تحمل می‌شوند (انجمن روانپژوهی آمریکا، ۲۰۱۳).

ترس از ارزیابی منفی، توجه متمرکز برخود و خود انتقادی نشانه‌های شناختی اصلی در این اختلال محسوب می‌شوند. در این اختلال، افراد بیم آن دارند تا در زمان قرار گرفتن در مقابل دیگران و انجام کار و یا اظهار نظری در جمع، به صورت منفی ارزیابی شوند. خود انتقادی به داشتن انتظارات بالا از خود و تلاش برای موفقیت بدون احساس رضایت کافی از نتیجه تلاش تعریف می‌شود. افراد خود انتقادگر، توسط احساسات بی ارزشی، انتقاد و گناه مشخص شده و به میزان زیادی در مقابل افسردگی آسیب پذیرند (بورتون و همکاران، ۲۰۱۳؛ محمودی، ۱۳۹۸ به نقل از کوپالا و همکاران، ۲۰۱۳؛ یاماگوچی، ۲۰۱۳). توجه متمرکز برخود، بخشی از تلاش فرد برای جلوگیری از دستپاچگی و تحقیر است. توجه به خود، دسترسی افراد مبتلا به هراس اجتماعی را به افکار و احساسات افزایش داده و عملکرد مطلوب آنها را مختل می‌کند (جاکمین، ۲۰۱۲) با توجه به سن شیوع اختلال، دانشجویان گروهی هستند که در معرض این اختلال قرار دارند، علاوه بر این، دوران دانشجویی خود یکی از دوره‌های پر تنفس و استرس در زندگی افراد محسوب می‌شود. برخی از مطالعات نشان از شیوع بالای این اختلال در بین دانشجویان دارد (دیلان و آلمیگو، ۲۰۲۱؛ عابادی و همکاران، ۲۰۲۱؛ سوریانینگرام، ۲۰۲۱).

اضطراب اجتماعی می‌تواند عامل بالقوه‌ای برای ترک دانشگاه باشد. حدود یک چهارم دانشجویانی که از تحصیل انصراف می‌دهند به دلیل اختلال اضطراب اجتماعی است (بروک و ویلوبی، ۲۰۱۵). علاوه بر آن، امکان دارد مشکلاتی همچون واپس‌گردی به مواد والکل در آنها افزایش یابد (اسکرای و وايت، ۲۰۱۳). برخی از دانشجویان مبتلا بدلیل ازوای، در معرض خطر اعتیاد به اینترنت قرار داشته و بدلیل ابتلا به افسردگی مستعد بروز ایده‌های خودکشی نیز هستند (یوسنر و یوزر، ۲۰۱۸). بنابراین انجام بموقع مداخلات در رفع علائم این اختلال بویژه در دانشجویان از اهمیت بسزایی برخوردار است. تاکنون روش‌های زیادی جهت بهبود این اختلال ارائه شده است. اما هر کدام علاوه بر تاثیر مطلوب، محدودیتهایی نیز داشته‌اند (زرگر و همکاران، ۱۳۹۳). درمان شناختی رفتاری بیش از سایر مداخلات روانشناختی در این مورد بکار رفته با این حال برخی مطالعات نتایج قابل تأمل از تاثیر ناچیز این مداخله بر نشانه‌های شناختی این اختلال بویژه در نوجوانان و جوانان گزارش نموده‌اند. موضوعی که می‌تواند بهانه‌ای برای تأمل و بازبینی درمان شناختی رفتاری در این گروهها باشد (اوанс، کلارک و لای، ۲۰۲۱؛ کودال و همکاران، ۲۰۱۸؛ دونوان و همکاران، ۲۰۱۵؛ ورگلن و همکاران، ۲۰۱۴؛ هیمبرگ و همکاران، ۲۰۱۰؛ راپی و همکاران، ۲۰۰۹؛ نورتون و پرایز، ۲۰۰۷، اتو و همکاران، ۲۰۰۰؛ هافمن، ۲۰۰۶؛ دیویدسون و همکاران، ۲۰۰۴).

موضوع مهم دیگر، داغ ننگ بیماری است. مساله‌ای که می‌تواند مانع بزرگی بر مسیر درمان ایجاد نماید. بسیاری از افراد بدلیل ترس از ارزیابی دیگران و برچسب بیماری، بدنبال درمان نیستند (مک دونا، لینچ و هنسی، ۲۰۲۱؛ اندرسون و همکاران، ۲۰۱۵). علاوه بر این، قید و بندهای تکلیف مدار درمان شناختی رفتاری و انعطاف پذیری کم، هزینه بالا و طولانی بودن دوره درمان را می‌توان از عوامل مخل درمان و انگیزه پائین شرکت کنندگان نام برد (باکنر، ۲۰۰۹).

بنابراین بررسی و مقایسه با سایر روش‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. روان‌نمایشگری از این دست درمانها است. این رویکرد برگرفته از نظریه مورینو (۱۹۴۶) است. رویکردی غنی که با تسهیل در رهاسازی عواطف حبس شده به افراد در کسب رفتارهای

جدید و شناخت قالب خویشتن کمک می‌کند (اورکیبی و همکاران، ۲۰۱۷؛ پوررضائیان، ۱۳۹۵؛ دهنی و همکاران، ۱۳۹۷). افراد مضطرب اجتماعی، سعی می‌کنند با سرکوب احساسات و عدم بیان انها، شانس بروز مجدد را به حداقل برسانند. رواننمایشگری فرصتی برای بازسازی یک تجربه ناراحت کننده در محیطی امن و کنترل شده بوجود می‌آورد، فرد مجال دارد تا ضمن بیان احساسات مهار شده، نگرشها و باورها خود را ارزیابی و اصلاح نماید (آلبال و همکاران). مطالعات نشان داده رواننمایشگری می‌تواند بهترین پیشنهاد برای دانشجویانی باشد که بدلیل بیم از برچسب بیماری حاضر به مراجعه به مراکز مشاوره نیستند (حمدیدی و همکاران، ۱۳۹۹، دادستان و همکاران، ۱۳۸۶؛ سیمسک و همکاران، ۲۰۲۰؛ موسوی و حقایقی، ۱۳۹۸؛ مجاهد و همکاران، ۱۳۹۹؛ نوویی، ۲۰۰۳).

وجود نتایج تامل برانگیز از اثربخشی درمان شناختی رفتاری در دانشجویان از سویی و ماهیت جذاب و انعطاف پذیر رواننمایشگری همراه با سایر ویژگیهای مطلوب از طرف دیگراین سوال بزرگ را بوجود می‌آورد که آیا رواننمایشگری می‌تواند مانند درمان شناختی رفتاری و حتی بهتر از آن علاوه اضطراب اجتماعی را در دانشجویان کاهش دهد؟ آیا می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن در میان دانشجویان باشد؟

• روش

این پژوهش به روش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون باگروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور تشکیل دادند. نمونه‌ها بصورت در دسترس و با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. در این میان، ۴۴۵ نفر از دانشجویان با رضایت شخصی در تحقیق شرکت نمودند. سپس ۶۰ نفر از دانشجویانی (در رده سنی بین ۱۸ تا ۳۰ سال) که حائز بیشترین نمره اضطراب اجتماعی بر اساس پرسشنامه هراس اجتماعی کانور شده انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه ۲۰ نفره تقسیم شدند. سپس به ترتیب؛ پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی، کانون توجه و خود انتقادی در اختیار سه گروه قرار گرفته و تکمیل گردید. در ادامه گروه‌های آزمایش، مداخله شناختی رفتاری و رواننمایشگری را بصورت مجزا در ۱۲ جلسه ۲ ساعته دریافت نموده و گروه سوم به عنوان گروه کنترل، درمانی دریافت نمود. جهت آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. سپس برای درک چگونگی تفاوتها از آزمون تعقیبی بنفوذی استفاده گردید.

ابزار

سیاهه اضطراب اجتماعی (Social Phobia Inventory): این سیاهه توسط کانور و همکاران (۲۰۰۰) تهیه شد. یک مقیاس خودسنجی ۱۷ ماده‌ای که هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای درجه‌بندی گردیده است. اعتبار آن با روش بازآزمایی در گروه‌هایی با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی برابر ۰/۷۸ تا ۰/۸۹ بوده و ضریب همسانی درونی آن (آلفای کرونباخ) در یک گروه بهنگار ۰/۹۴ گزارش شده است، همچنین برای مقیاس‌های فرعی، ترس ۰/۸۹، اجتناب ۰/۹۱ و ناراحتی فیزیولوژیکی ۰/۸۰ گزارش شده است (کانور و همکاران، ۲۰۰۰). اعتباریابی سیاهه اضطراب اجتماعی در ایران توسط حسنوند عموزاده و همکاران (۱۳۹۴) انجام و آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۰/۹۴ و ضریب بازآزمایی آن ۰/۹۶ بدست آمد. روایی سیاهه در این پژوهش به روش روایی همگرا با نشانگان تجدید نظر شده ۹۰ ماده‌ای و مقیاس پرسشنامه خطای شناختی به ترتیب ۰/۸۲ و ۰/۴۷ بدست آمد.

فرم کوتاه شده مقیاس ترس از ارزیابی منفی (Fear of Negative Evaluation Scale-Brief Form): این مقیاس توسط لری (۱۹۸۳) و با اقتباس از فرم اصلی ساخته شد. این مقیاس دارای ۱۲ ماده است. پاسخ دهنده، وضعیت خود را در هر پرسش بر روی یک طیف پنج گزینه‌ای نشان می‌دهد (لری، ۱۹۸۳). در پژوهش شکری و همکاران (۱۳۸۷) همبستگی معنادار بین نمره کلی و زیرمقیاس‌های ترس از ارزیابی منفی با زیرمقیاس‌ها و نمره کلی پرسشنامه دشواری‌های بین فردی و مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان، روایی همگرای این فرم را تأیید شد. ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب بازآزمایی با فاصله (دو هفته) نمره کلی و زیرمقیاس‌های فرم کوتاه شده مذکور نشان داد که این مقیاس اعتبار مقبولی دارد. ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کلی، فرم کوتاه شده ذکر شده و زیرمقیاس‌های سؤال‌های نمره گذاری شده مثبت و سؤال‌های نمره گذاری شده منفی

به ترتیب برابر با ۰/۸۲، ۰/۸۱ و ضرایب بازآزمایی با فاصله (دو هفته) برای نمره کلی، فرم اشاره شده و زیرمقیاس‌ها بین ۰/۷۹ – ۰/۷۷ بدست آمد.

پرسشنامه کانون توجه (Focus of Attention Questionnaire): پرسشنامه کانون توجه به وسیله وودی، چامبلس و گلاس در سال ۱۹۹۷ ساخته شده و دارای دو زیرمقیاس با پرسش‌های مدرج پنج نمره‌ای است. این پرسشنامه ۱۰ ماده دارد. هر ماده شامل یک مقیاس ۵ نمره‌ای است. ضمناً روایی سازه این مقیاس مورد تائید واقع شده است (وودی، چامبلس و گلاس، ۱۹۹۷). خیر و همکاران (۱۳۸۷) اعتبار پرسشنامه را با آلفای کرونباخ برای مولفه توجه متصرکز برخود ۰/۷۵ و برای کانون توجه بیرونی ۰/۸۶ بدست آورده‌اند. همچنین روایی سازه ای آن به روش تحلیل مولفه‌های اصلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تحلیل نشان داده‌اند که مولفه‌ها ۵۵/۸۵ درصد از واریانس نمرات کانون توجه را به خود اختصاص داده‌اند.

مقیاس خود انتقادی (Levels of Self-Criticism Scale): این مقیاس توسط تامسون و زوروفر (۲۰۰۴) ساخته شده است.

این مقیاس شامل ۲۲ سوال بوده و دارای دو مولفه خودانتقادی درونی شده و مقایسه‌ای است. پاسخ‌های سوال بر اساس طیف لیکرت ۷ درجه‌ای نمره گذاری می‌شود. اعتبار پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ سوالها به میزان ۰/۸۱ بدست آمده است (تامسون و زوروفر، ۲۰۰۴). یاماگوچی و کیم (۲۰۱۳) در مطالعه خود همسانی درونی مناسبی را برای این مقیاس گزارش کردند (آلفا کرونباخ = ۰/۹۰). در پژوهش رجبی و کارجوکسمایی (۱۳۹۱) روایی مقیاس با اجرا بر روی ۴۶۸ دانشجو و با روش تحلیل عوامل و ضریب همبستگی ماده‌ها با نمره کل مطلوب بدست آمده است.

معیارهای ورود شامل رضایت از مداخله درمانی، عدم فارغ التحصیلی تا پایان جلسات مداخله و پس آزمون، عدم درمانهای موازی و دارو درمانی در طی مداخله و معیارهای خروج شامل؛ وجود اختلال روانپزشکی تائید شده دیگر از جمله سایکوز و اختلال دو قطبی، اختلالهای تجزیه‌ای و اضطراب ناشی از اختلالهای پزشکی بودند که همگی از طریق مصاحبه تشخیصی بر اساس معیارهای DSM-5 مورد بررسی قرار گرفتند. جایگذاری افراد در گروه‌ها به شکلی بود که ضمن اصل تصادفی بودن حتی الامکان گروه‌ها از نظر رده بندي نمرات تشابه داشته باشند. درمان شناختی رفتاری گروهی بر اساس مدل هیمبرگ با اقتباس از کتاب گروه درمانگری شناختی رفتاری انجام گرفت (بایلینگ، مک آبی و آنتونی، ۲۰۰۶)، ترجمه خدایاری فرد و عابدینی (۱۳۸۹). (جدول شماره ۱).

جدول ۱. خلاصه جلسات درمان شناختی رفتاری گروهی

جلسات	هدف کلی	فعالیتها
اول	طرح کردن منطق درمان	معرفی افراد گروه و درمانگر به یکدیگر، توصیف مشکل هر یک از افراد گروه، ارائه دستورالعمل‌های مربوط به کار گروهی، توصیف ماهیت اضطراب، توصیه خواندن کتاب‌های خودیاری
دوم و سوم	تاكید بر تحریفهای شناختی	بررسی برگه‌های بازیبینی، مباحثه در مورد نقش شناخت‌ها در تداوم اضطراب اجتماعی، طرح مثالهایی درباره تحریفهای شناختی و تشویق افراد گروه برای شناسایی افکار ایجاد‌کننده اضطراب، آموزش جهت تکمیل برگه ثبت افکار، مبارزه با تفکر فاجعه‌آمیز، تشویق افراد گروه به انجام ازماشیهای رفتاری برای آزمودن اعتبار پیش‌بینی‌ها و باورهای اضطراب‌زا، تکلیف منزل شامل تکمیل برگه‌های ثبت افکار و آموزش برای انجام حداقل دو آزمایش رفتاری
چهارم	مواجهه واقعی	بررسی تکالیف، ارائه بازخورد‌های اصلاحی و کمک به افراد گروه برای مبارزه با تفکر اضطراب‌زا، تمرین مواجهه، تشویق به مطالعه کتاب خودیاری، ارائه تکلیف برای ۴-۶ مواجهه واقعی
پنجم	و ایفای نقش	بررسی تکالیف منزل، ارائه بازخورد‌های اصلاحی در مورد استفاده از راهبردهای شناختی و مواجهه، آموزش مهارت‌های اجتماعی، تعیین مهارت‌های خاص توسط اعضای گروه و تمرین آنها، تشویق به انجام مهارت‌های اجتماعی همراه با تمرین مواجهه
دهم تا دوازدهم	آموزش و تمرین مهارت‌های اجتماعی	در رابطه با گروه روان‌نمایشگری، در هر جلسه سه مرحله روش روان‌نمایشگری مورنو اجرا شد که شامل؛ مرحله اول (آماده سازی و گرم کردن اعضا بر پایه زمینه‌های فردی. مرحله دوم) کمک به فرد جهت اجرای طرح مساله اش. مرحله سوم) درون پردازی، انتخاب تمرین رفتاری، مشارکت و اختتام بود.

با توجه به اینکه متخصصین این حوزه معتقدند این درمان در مقایسه با سایر درمانها دارای برنامه تعیین شده‌ی خاصی نیست و بسته به تجارب مشکل زا در جلسه اتخاذ می‌گردد، لذا برنامه مداخله‌ای زیر با توجه به مشکل اصلی افرادگروه انجام گرفت (جدول شماره ۲) (فتحی، ۱۳۹۹).

جدول ۲. خلاصه جلسات درمان رواننمایشگری

جلسات	هدف کلی	فعالیتها
اول	آشنا سازی و ایجاد همگرایی	آشنا سازی افرادگروه با یکدیگر، توضیح برنامه مداخله رواننمایشگری برای اعضاء، بیان ساختار، اهداف و قوانین جلسات، ایجاد اعتماد، بحث و تبادل نظر در مورد خواسته‌ها و هدف هر کدام از اعضا
دوم و سوم	تعیین و تمرین نقش‌ها	ایجاد صمیمیت بیشتر، سعی در ایجاد ارتباط و گفتگو و طرح مشکل، تشویق اعضاء به بیان مشکلات خود و انتخاب پروتاگونیست، تشریک مساعی در جهت کمک به پروتاگونیست بعنوان من یاور و بازخورد به او، تمرین آرام سازی
چهارم و پنجم	تمرین و امادگی انجام تکنیکها	توضیح درمورد هیجانات و احساسات مانند؛ ترس، اضطراب، شادی، غم، خشم و...، آمادگی گروه با استفاده از تکنیک پرتتاب توب فرضی، استفاده از فن صندلی داغ، استفاده از فن زبان بدنه، استفاده از فن تک گویی برای ابراز هیجانات و احساسات شخص اول و آمادگی جهت اجرای عملی، تبادل نظر بین اعضاء و پروتاگونیست، تمرین آرام سازی
ششم تا نهم	انجام تکنیکها	گرم کردن با استفاده از فن پرتتاب توب فرضی یا فن داستانگویی، تمرینات تمرکزی، بیان و بدنه، تشویق اعضاء برای بیان مشکلات خود و انتخاب پروتاگونیست، پرداختن به مشکل پروتاگونیست، مشارکت جهت کمک به پروتاگونیست بعنوان یاور با استفاده از فن دوگانه و وارونگی نقش، انقال و شرکت در تجارت هیجانی و نظرات اعضا با پروتاگونیست و همدیگر، با ایفای نقش و استفاده از فن فرافکنی به آینده، تمزین آرام سازی
دهم تا دوازدهم	جمع بندی و ارزیابی	مرور جلسات، بازنگری برنامه، بیان خواسته‌ها، اهداف و آرزوها و تبادل نظر با یکدیگر، ایجاد انگیزه و امید برای اعضاء و اختتام

در پایان، پس آزمون‌ها در هر سه گروه اجرا گردید. ضمناً این پژوهش با کد اخلاق IR.IAU.MSH.REC.1399.075 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مورد تصویب قرار گرفت. شرکت کنندگان فرم رضایت اخلاقی را پر نموده و پژوهشگر در مورد محرومانه بودن اطلاعات به شرکت کنندگان اطمینان داد. در مورد گروه کنترل اصول اخلاقی ایجاب می‌نمود تا پس از انجام پژوهش مداخلات درمانی در مورد آنها صورت گیرد اما پراکنده شدن دانشجویان بدليل شیوع بیماری کووید ۱۹ مانع از انجام آن شد که می‌توان از این موضوع در کنار عدم امکان آزمون پیگیری بهمان دلیل ذکر شده از محدودیتهای مهم این پژوهش یاد نمود.

• یافته‌ها

نتایج بررسی داده‌ها نشان داد ۶۰ دانشجو با بالاترین نمره اضطراب اجتماعی، اغلب مونث (۶۰ درصد)، سال اولی (۳۳ درصد)، رشته پرستاری (۳۰ درصد)، مجرد (۸۰ درصد) و غیر بومی (۶۱ درصد) بودند. در ادامه، شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه‌ها در جدول شماره ۳ ارائه شده است.

جدول ۳. شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

گروه						متغیرها	مرحله		
کنترل		رواننمایشگری		شناختی-رفتاری گروهی					
انحراف استاندارد	میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	انحراف استاندارد	میانگین				
۱۴/۶۵	۱۰/۹/۵۵	۱۴/۱۰	۱۱۱/۵۴	۱۳/۷۱	۱۱۰/۹۳	پیش آزمون	خودانتقادی		
۱۵/۱۷	۱۱۰/۰/۹	۲۴/۱۰	۹۸/۳۱	۲۰/۰/۵	۹۰/۰/۵۶	پس آزمون			
۵/۴۴	۵۱/۱۱	۵/۶۴	۵۰/۲۲	۵/۵۴	۵۱/۶۰	پیش آزمون	ترس از ارزیابی منفی		
۶/۵۶	۵۲/۰/۰	۶/۸۸	۴۱/۶۶	۸/۷۴	۴۰/۴۶	پس آزمون			
۵/۳۲	۱۹/۱۹	۵/۶۶	۱۸/۷۶	۳/۵۴	۱۹/۳۳	پیش آزمون	توجه متمرکز بر خود		
۵/۷۹	۱۹/۰/۰	۴/۱۸	۱۴/۶۸	۳/۵۷	۱۵/۷۰	پس آزمون			

همان طور که در جدول شماره ۳ ملاحظه می‌شود، میانگین نمرات متغیرهای وابسته در گروه‌های آزمون، در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تغییر قابل توجهی نشان داده در حالیکه در گروه کنترل این اختلاف بسیار اندک است. به منظور مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل و بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و روان‌نمایشگری بر متغیرهای وابسته، تحلیل کواریانس چندمتغیری انجام گرفت. نتایج بررسی پیش فرض‌های مانکووا نشان از استقلال مشاهدات داشت. آزمون ام باکس نشان داد همگنی ماتریس‌های واریانس و کواریانس برقرار است ($p=0.156$). همگنی شبیخ خط رگرسیون (تعامل گروه با پیش آزمون‌ها متغیرهای مورد مطالعه) محاسبه شد. بررسی‌ها نشان داد که همگنی شبیخ خط رگرسیون برای متغیرهای وابسته؛ ترس از ارزیابی منفی ($p=0.572$)، توجه متمرکز بر خود ($p=0.706$) و خود انتقادی ($p=0.972$) رعایت شده است. همچنین شاخص چولگی و کشیدگی برای تمام متغیرهای مورد مطالعه بین ۱± بود. از این‌رو، می‌توان گفت نمرات دارای توزیع نرمال هستند. آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس‌ها نشان داد؛ واریانس‌های گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیرهای ترس از ارزیابی منفی ($p=0.427$)، توجه متمرکز بر خود ($p=0.424$) و خود انتقادی ($p=0.573$) تفاوت معناداری با هم ندارند.

جدول ۴. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری

نام آزمون	F	مقدار	df خطای فرضیه	df خطا	سطح معناداری	اندازه اثر
اثر پیلایی	۹۵۱/۵۳۹	۰/۹۹۷	۸	۲۰	۰/۰۰۱	۰/۵۶۷
لامبایدی ویلکز	۹۵۱/۵۳۹	۰/۰۰۳	۸	۲۰	۰/۰۰۱	۰/۵۶۷
اثر هتلینگ	۹۵۱/۵۳۹	۳۸۰/۶۱۶	۸	۲۰	۰/۰۰۱	۰/۵۶۷
بزرگترین ریشه روی	۹۵۱/۵۳۹	۳۸۰/۶۱۶	۸	۲۰	۰/۰۰۱	۰/۵۶۷

همان‌طور که در جدول ۴ مشاهده می‌شود، بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای وابسته در مرحله پس آزمون در سطح $p=0.001$ تفاوت معنی دار وجود دارد. بر این اساس، می‌توان گفت که حداقل در یکی از متغیرهای وابسته بین گروه‌ها تفاوت معنادار وجود دارد.

در ادامه برای پی بردن به اینکه کدام یک از مؤلفه‌های شناختی بین گروه‌ها تفاوت معنادار دارد، تحلیل کواریانس تک متغیره روی میانگین نمره‌های پس آزمون متغیرهای وابسته با کنترل پیش آزمون‌ها در گروه‌ها انجام گرفت (جدول شماره ۵).

جدول ۵. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری روی میانگین نمرات متغیرهای وابسته با کنترل پیش آزمون‌ها در گروه‌ها

متغیر	منابع اثر	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	F	سطح معناداری
پیش آزمون	۱۱/۲۶۷	۱	۱۱/۲۶۷	۱۱/۲۶۷	۰/۰۲۸	۰/۹۷۲
گروه * پیش آزمون	۶۵۲۲/۰۷۶	۲	۳۲۶۱/۰۳۳	۳۲۶۱/۰۳۳	۱۷/۱۱۲	۰/۰۰۱
واریانس خطای وابسته	۵۱۴۵/۳۰۰	۲۷	۱۹۰/۵۶۷	۱۹۰/۵۶۷		
واریانس کل	۱۱۶۷۸/۶۴۴	۳۰				
پیش آزمون	۳۶/۲۰۰	۱	۳۶/۲۰۰	۳۶/۲۰۰	۰/۰۷۲	۰/۰۷۲
گروه * پیش آزمون	۱۰۲۲/۸۶۷	۲	۵۱۱/۴۳۳	۵۱۱/۴۳۳	۱۱/۰۵۹	۰/۰۰۱
واریانس خطای وابسته	۱۱۹۴/۶۰۰	۲۷	۴۴/۲۴۴	۴۴/۲۴۴		
واریانس کل	۲۲۵۳/۶۶۷	۳۰				
پیش آزمون	۹/۲۶۷	۱	۹/۲۶۷	۹/۲۶۷	۰/۳۵۲	۰/۰۷۰۶
گروه * پیش آزمون	۱۰۵/۰۰۰	۲	۵۲/۵۰۰	۵۲/۵۰۰	۵/۳۴۳	۰/۰۱۱
واریانس خطای وابسته	۲۶۵/۳۰۰	۲۷	۹/۸۲۶	۹/۸۲۶		
واریانس کل	۳۷۹/۵۶۷	۳۰				

بر اساس جدول شماره ۵ نسبت F تحلیل کواریانس تک متغیری در متغیرهای خودانتقادی (F=۱۷/۱۱۲ و $p=0.001$)، ترس از ارزیابی منفی (F=۱۱/۰۵۹ و $p=0.001$) و توجه متمرکز بر خود (F=۵/۳۴۳ و $p=0.011$) معنادار است. به بیان دیگر،

بین متغیرهای وابسته فوق در گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد ($p < 0.05$). جهت بررسی اینکه تاثیر در کدام یک از گروه‌های آزمایشی بیشتر بوده است نتایج آزمون تعديل بونفرونی با نمرات تعديل یافته در جدول شماره ۶ گزارش شده است.

جدول ۶. نتایج بررسی تفاوت‌های دو به دو گروه‌ها در نمرات متغیرهای وابسته در پس آزمون گروه‌ها

متغیرهای وابسته	گروه	تفاوت میانگین‌ها	خطای معیار	سطح معناداری
خودانتقادی	روان‌نمایشگری	۷/۵۰	۴/۳۸	۰/۲۹۲
	کنترل	۲۰/۷۳	۴/۳۱	۰/۰۰۱
ترس از ارزیابی منفی	روان‌نمایشگری	۲/۲۸	۱/۹۲	۰/۷۴۱
	کنترل	۱۱/۷۴	۱/۸۹	۰/۰۰۱
توجه متمرکز بر خود	روان‌نمایشگری	۰/۴۴	۰/۵۶	۱/۰۰۰
	کنترل	۳/۴۶	۰/۵۵	۰/۰۰۱

نتایج جدول فوق همچنین نشان می‌دهد در گروه‌های مداخله، تفاوت معناداری در میانگین نمرات پس آزمون متغیرهای وابسته وجود ندارد و تنها تفاوت با گروه کنترل معنادار است. یعنی تفاوت میانگین همه متغیرها در بین هر کدام از گروه‌ها از طرفی و گروه کنترل از طرف دیگر معنادار است؛ اماً بین دو گروه آزمایش تفاوت معنادار نیست.

• بحث

فرضیه اصلی پژوهش بیان می‌کند درمان شناختی رفتاری با روان‌نمایشگری بر ترس از ارزیابی منفی، توجه متمرکز بر خود و خود انتقادی در دانشجویان متفاوت است. نتایج حاصل از تحقیق این فرضیه را تائید نمی‌کنند. در واقع بین دو روش فوق تفاوتی معناداری در نمرات پس آزمون وجود ندارد.

این نتایج تا حدی با یافته‌های مطالعه گوکایاو همکاران (۲۰۲۰) همسوی دارد. همچنین با نتایج مطالعه عابدی تهرانی و همکاران (۱۳۹۹)؛ تردول، کوما و رایت (۲۰۲۰) و همامسی (۲۰۰۲) نیز از جنبه‌هایی همراستا است.

در مطالعه گوکایاو همکاران (۲۰۲۰)، نتایج بررسی چندین مطالعه تحقیقاتی در مورد اثربخشی درمان شناختی رفتاری و روان‌نمایشگری بر روی نشانه‌های شناختی اضطراب اجتماعی نشان داد، هر دو در بهبود علائم موثرند. ضمن آنکه در مطالعاتی که در آنها اثربخشی درمان شناختی رفتاری ادغام شده با فنون روان‌نمایشگری مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج بیانگر تاثیر بیشتر آن در بهبود علائم بوده است. بطور مثال نتایج مطالعه عابدی تهرانی و همکاران (۱۳۹۹) نشان داد نشانه‌های اضطراب اجتماعی در شرکت کنندگان در جلسات درمان شناختی رفتاری ادغام شده با روان‌نمایشگری نسبت به گروه کنترل به میزان قابل توجیهی کاهش یافته است.

در واقع نتایج مطالعات فوق نه تنها حاکی از کارآمدی روان‌نمایشگری در کاهش علائم اضطراب اجتماعی است بلکه نشانگر تاثیر مثبت این فنون در مواردی است که دستورالعمل‌های قاعده مند شناختی رفتاری خود را در پیشبرد دوره‌های درمانی ناتوان می‌بینند.

از سوی دیگر در مطالعه تردول و همکاران (۲۰۰۲) بر روی اضطراب اجتماعی در دانشجویان و بررسی تاثیر ترکیب دو شیوه شناختی رفتاری و روان‌نمایشگری، از تکنیکهای شناختی رفتاری در بهبود و تسهیل مراحل روان‌نمایشگری استفاده شد. در واقع تکنیکهای شناختی رفتاری نه تنها جنبه‌های پالایشی روان‌نمایشگری را افزایش می‌دهد بلکه می‌تواند با تأکید بر جنبه‌های حل مساله متمرکز بر هدف موجود در روش شناختی رفتاری، تاثیر فنون روان‌نمایشگری را تقویت نمایند. همچنین در مطالعه همامسی (۲۰۰۲) گروهی از شرکت کنندگان که در مورد آنها ترکیبی از درمان شناختی رفتاری و روان‌نمایشگری اجرا گردید، میزان تحریفات شناختی در ارتباطات بین فردی به میزان قابل توجیهی کاهش و روابط بین فردی بهبود یافته است.

هرچند مطالعات صرفاً به مقایسه دو روش نپرداخته اند، اما در هرکدام از انها، یکی از روشها توسط فنون روش دیگر و با ترکیب با آنها تقویت و نتایج آن در گروه آزمون مورد بررسی و تائید واقع شده است. از آنجائیکه در چندین مطالعه، مداخله شناختی رفتاری و روان‌نمایشگری به نوبه خود، کارآیی خود را در بهبود و تقویت همدیگر نشان داده اند، می‌تواند تا حد زیادی عدم معناداری تفاوت دو روش ذکر شده در کاهش علائم شناختی اضطراب اجتماعی در مطالعه حاضر را توجیه نموده و به نوعی همترازی و همسنگی خود را در کاهش این علائم تائید نماید.

علیرغم برخی نتایج، مسلماً نمی‌توان اثر بخشی درمان شناختی رفتاری را در بهبود علائم شناختی اضطراب اجتماعی کتمان نمود. با این حال روان‌نمایشگری نیز علاوه بر نتایج مطالعات گذشته در این مطالعه نیز تاثیرگذاری خود را در کاهش نسبتاً چشمگیر علائم اختلال نشان داد. بهر حال همین که توانسته با درمان شناخته شده ای همچون مداخله شناختی رفتاری، همسنگی نماید جای تامل دارد.

هدف از انجام این تحقیق نشان دادن ضعف درمان شناختی رفتاری در برابر روان‌نمایشگری نبوده بلکه ضمن معطوف نموده توجهات به مداخله مفید اما نسبتاً مغفول روان‌نمایشگری در پی آن است تا با نگاه آسیب شناسانه عوامل مخل در روند درمان شناختی رفتاری را نیز بیان نماید. درواقع جدای از سایر نتایج، این تحقیق روشی نمود چنانچه انگیزه‌های لازم و شرایط کافی جهت انجام درمان شناختی رفتاری مهیا باشد شرکت کنندگان می‌توانند بر احساسات منفی همانند برچسب اختلال و واهمه از ارزیابی و قضاوت دیگران غلبه نموده و این مداخله بخوبی از پس اضطراب اجتماعی برآید.

مسلماً درمان شناختی رفتاری در مقایسه با روان‌نمایشگری از چارچوب و اسلوب منسجم‌تری برخوردار است اما همین نظامندی و تکلف می‌تواند نقطه ضعفی نیز برای این روش بویژه در گروههای سنی نوجوان و جوان که معمولاً کمتر حاضر به تقید و تعین هستند، محسوب گردد. اما همگنی و تشابه در ویژگیهای شرکت کنندگان و ایجاد نوعی حس رقابت در انجام تکالیف و تشویق‌ها و بازخوردهای مثبت درمانگر و گروه، باعث تداوم و حفظ انگیزه تا حصول نتایج مطلوب در این گروه شده است.

همچنین بر اساس فرضیه فرعی اول؛ درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی، توجه مرکز برخود و خود انتقادی در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی تاثیر دارد. با توجه یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت؛ این مداخله بر نشانه‌های مذکور موثر است.

یافته فوق با نتایج مطالعه حیدریان فرد و همکاران (۱۳۹۴)، باتلر و همکاران (۲۰۲۱)، هانگراسکوب و همکاران (۲۰۱۸)، یابنده و همکاران (۱۳۹۸)، فوگارتی و همکاران (۲۰۱۹)، اسکاینی و همکاران (۲۰۱۶)، رضایی و همکاران (۱۳۹۷)، رحمانیان و همکاران (۱۳۹۹) همسوی و همخوانی دارد. در مطالعه حاضر، مداخله شناختی رفتاری توانسته است تفاوت معناداری در نمرات پس آزمون نشانه‌های شناختی اضطراب اجتماعی نسبت به گروه کنترل ایجاد نماید.

همچنین برپایه فرضیه فرعی دوم؛ روان‌نمایشگری بر ترس از ارزیابی منفی، توجه مرکز برخود و خود انتقادی در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی موثر است. با توجه به یافته‌ها، می‌توان استنباط نمود این روش بر نشانه‌های ذکر شده تاثیر دارد. یافته‌های فوق با مطالعه موسوی و حقایق (۱۳۹۸)، حمیدی و همکاران (۱۳۹۹)، دادستان و همکاران (۱۳۸۶)، مجاهد و همکاران (۱۳۹۹) دوگان (۲۰۱۸)؛ رودوکائیت و ایندریونین (۲۰۱۹)، سیمسک و همکاران (۱۳۹۹) همسوی و همخوانی دارد.

در مطالعه موسوی و حقایق (۱۳۹۸) روان‌نمایشگری منجر به تفاوت معنادار در نمرات اضطراب اجتماعی در گروه آزمون و گواه شده بود. همچنین نتایج مطالعه حمیدی و همکاران (۱۳۹۹) بیانگر تاثیر مطلوب روان‌نمایشگری بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان شده بود. ماحصل پژوهش دادستان و همکاران (۱۳۸۶) نیز نشان می‌داد پس از انجام روان‌نمایشگری گروه آزمون در مقایسه با گروه گواه، کاهش چشمگیری در نمرات اضطراب اجتماعی خود یافته بود. در پژوهش سیمسک و همکاران (۱۳۹۹) هم نتایج مشابهی دیده می‌شود.

طبعاً این پژوهش نیز با محدودیتهایی همراه بود اما مهمترین آن را می‌توان عدم آزمون پیگیری بدليل شیوع بیماری کووید ۱۹ و تعطیلی دانشگاه و پراکنده شدن دانشجویان ذکر نمود.

پیشنهاد می شود؛ آزمون پیگیری در زمان مناسبی انجام گیرد و نیز در تحقیقات آینده مقایسه مدل ترکیبی با هر کدام از مداخلات صورت گیرد و نهایتاً پیشنهاد می گردد دوره های آموزشی و کارگاهی بیشتری از مداخله روان نمایشگری را جهت آموزش این روش به مشاوران و درمانگران جهت بهبود مشکلات نوجوانان و جوانان دارای اضطراب اجتماعی ترتیب داده شود.

• نتیجه گیری

مداخله شناختی رفتاری و روان نمایشگری هر دو می توانند اثربخشی قابل توجهی در بهبود علائم شناختی اضطراب اجتماعی در دانشجویان داشته باشند. این مداخلات می توانند بسته به شرایط و امکانات در دانشجویان و بویژه در مواردی که درمان و پیگیری های همراه با موانع و محدودیتهایی روبه روست بصورت جایگزین و یا ادغام یافته مورد استفاده قرار گیرند.

• قدردانی

پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه دکتری محقق بوده و بر خود لازم می دانیم از معاونت محترم آموزشی و دانشجویی و نیز دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور به دلیل همکاری صمیمانه با محقق قدردانی نمایم.

• منابع

- بایبلنگ، پی. جی..، مک کب، ر. ای..، آنتونی، ام. ام (۲۰۰۶). گروه درمانگری شناختی - رفتاری. ترجمه محمد. خدایاری فرد، و یاسمین. عابدینی، ۱۳۸۹. انتشارات دانشگاه تهران.
- پوررضائیان، مهدی. (۱۳۹۵). ارزیابی بالینی تأثیر سایکودrama در درمان اضطراب اجتماعی (مورد پژوهشی). مطالعات روانشناسی بالینی، ۶(۲۴)، ۴۶-۲۹.
- حسنوند عموزاده، مهدی. عقیلی، محمد مهدی و حسنوند عموزاده، معصومه. (۱۳۹۲). اثربخشی آموزش گروهی شناختی - رفتاری عزت نفس بر اضطراب اجتماعی و سلامت روان نوجوانان مضطرب اجتماعی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، ۱۴(۲)، ۲۶-۳۷.
- حمیدی، فریده..، نصری، صادق..، و حافظی، نرگس. (۱۳۹۹). اثربخشی روان نمایشگری بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان مهاجر: با تأکید بر مهاجران افغان. رویش روانشناسی، ۹(۵)، ۳۱-۳۸.
- خیر، محمد..، استوار، صغیر..، لطیفیان، مرتضی..، تقوی، محمدرضا..، و سامانی، سیامک. (۱۳۸۷). اثر واسطه گری توجه مرکز بر خود و خود کارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های داوری. مجله روانپژشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۱۴(۱)، ۲۴-۳۲.
- دادستان، پریخ..، اناری، آسیه..، و صالح صدق پور، بهرام. (۱۳۸۶). اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، ۴(۱۴)، ۱۱۵-۱۲۳.
- دهنوی، سعید..، زاده محمدی، علی..، و هاشمی، فرناز. (۱۳۹۷). اثربخشی روان نمایشگری مبتنی بر رویکرد وحدت مدار بر تاب آوری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. علوم اعصاب شفای خاتم، ۶(۳)، ۱۸-۱۰.
- رجبی، غلامرضا..، و کارجوکسمایی، سونا. (۱۳۹۱). کفایت شاخص های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی بک-ویرایش دوم. اندازه گیری تربیتی، ۳(۱۰)، ۱۳۹-۱۵۷.
- رضایی، فهیمه..، امیری، مهدی..، و ظاهری، الهام. (۱۳۹۷). اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، ۸(۳۲)، ۱۳۳-۱۶۰.
- شکری، امید..، گراوند، فریبرز..، نقش، زهرا..، علی طرخان، رضا..، و پاییزی، مریم. (۱۳۸۷) ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی. مجله روانپژشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۱۴(۳)، ۳۱۶-۳۲۵.
- علیزاده، مژده..، و یاری دهنوی، مراد. (۱۴۰۰). بررسی پدیدار شناختی عوامل آرامش بخش در دانشجویان. مجله روانشناسی، ۲۵(۲)، ۱۹۰-۲۱۴.
- فتحی، طاهر. (۱۳۹۹). سایکودرام، پیشگیری و درمان بیماریهای روانی اجتماعی در صحنه نمایش. تهران. انتشارات ناهید، ۶۸-۷۳.
- محمدی، هیوا. (۱۳۹۸). رابطه سبکهای دلستگی و گرایش به خودکشی با نقش تعدیل کنندگی خود انتقادی و وابستگی در دانشجویان. مجله روانشناسی، ۲۳(۴)، ۴۲۴-۴۳۹.

موسوی، حامد.. و حقایق، سید عباس. (۱۳۹۸). اثربخشی روان‌نمایشگری بر اضطراب اجتماعی، عزت نفس و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان واحد تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی. *فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی*, ۲۰، (۳)، ۲۰-۲۲.

- Abadi, D. A. M., Albaggar, M. A. A., Aftab, D. R., & Ahmed, D. (2021). Prevalence of social phobia and its risk factors among students at King Khalid University, Abha city, Saudi Arabia. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 13(2).3471-3477.
- Abeditehrani, H., Dijk, C., Toghchi, M. S., & Arntz, A. (2020). Integrating cognitive behavioral group therapy and psychodrama for social anxiety disorder: An intervention description and an uncontrolled pilot trial. *Clinical Psychology in Europe*, 2(1), 1-21.
- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5).Arlington,VA:AmericanPsychiatricPublishing.
- Anderson, K. N., Jeon, A. B., Blenner, J. A., Wiener, R. L., & Hope, D. A (2015). How people evaluate others with social anxiety disorder: A comparison to depression and general mental illness stigma. *American Journal of Orthopsychiatry*, 85(2), 131-138.
- Albal, E., Sahin-Bayindir, G., Alanli, O., & Buzlu, S. (2021). The Effects of Psychodrama on the Emotional Awareness and Communication Skills of Psychiatric Nurses: A Randomized Controlled Trial. *The Arts in Psychotherapy*,75(10).
- Butler, R. M., O'Day, E. B., Swee, M. B., Horenstein, A., & Heimberg, R. G. (2021). Cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder: Predictors of treatment outcome in a quasi- naturalistic setting. *Behavior Therapy*, 52(2), 465-477.
- Buckner, J. D. (2009). Motivation enhancement therapy can increase utilization of cognitive-behavioral therapy: The case of social anxiety disorder. *Journal of Clinical Psychology*, 65(11), 1195-1206.
- Burton, M., Schmertz, S. K., Price, M., Masuda, A., & Anderson, P. L. (2013). The relation between mindfulness and fear of negative evaluation over the course of cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder. *Journal of clinical psychology*, 69(3), 222-228.
- Brook, C. A., & Willoughby, T. (2015). The social ties that bind: Social anxiety and academic achievement across the university years. *Journal of Youth and Adolescence*, 44(5), 1139-1152.
- Connor, K. M., Davidson, J. R., Churchill, L. E., Sherwood, A., Weisler, R. H., & Foa, E.(2000). Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN): New self-rating scale. *The British Journal of Psychiatry*, 176(4), 379-386.
- Davidson, J. R., Foa, E. B., Huppert, J. D., Keefe, F. J., Franklin, M. E., Compton, J. S., & Gadde, K. M. (2004). Fluoxetine, comprehensive cognitive behavioral therapy, and placeboin generalized social phobia. *Archives of general psychiatry*, 61(10), 1005-1013.
- Dogan, T. (2018). The effects of the psychodrama in instilling empathy and self-awareness: A pilot study. *PsyCh journal*, 7(4), 227-238.
- Donovan, C. L., Cobham, V., Waters, A. M., & Ochipinti, S. (2015). Intensive group-based CBT for child social phobia: A pilot study. *Behavior Therapy*, 46(3), 350-364.
- Dialan, S., & Almigo, N. The prevalence of social anxiety disorder (SAD) among higher education students in Malaysia OPTIMA: *Journal of Guidance and Counseling*, 1(1), 73-87.
- Evans, R., Clark, D. M., & Leigh, E. (2021). Are young people with primary social anxiety disorder less likely to recover following generic CBT compared to young people with other primary anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*,49(3),352-369.
- Fogarty, C., Hevey, D., & McCarthy, O. (2019). Effectiveness of cognitive behavioural group therapy for social anxiety disorder: Long-term benefits and aftercare. *Behavioural and cognitive psychotherapy*, 47(5), 501-513.
- Gökkaya, F., Elifnur, Z., İşık, İ., Önkür, B., Bozdemir, T., Kızıltan, R., ... & Deniz, C. (2020). Investigation of Effectiveness Studies Conducted by Using Cognitive Behavioral Group Therapy, Psychodrama and Art Therapy in Turkey. *Psikiyatride Guncel Yaklasimlar*, 12(2), 258-273.
- Hamamci, Z. (2002). The Effect of Integrating Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy on Reducing Cognitive Distortions in Interpersonal Relationships. *Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama&Sociometry*,55(1),3-14.
- Heimberg, R. G., Brozovich, F. A., & Rapee, R. M. (2010). A cognitive behavioral model of social anxiety disorder: Update and extension. In *Social anxiety* (pp. 395-422). Academic Press.
- Hofmann, S. G., & Smits, J. A. (2008). Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. *The Journal of clinical psychiatry*, 69(4), 621.630
- Jakymin, A. K., & Harris, L. M. (2012). Self-focused attention and social anxiety. *Australian Journal of Psychology*, 64(2), 61-67.
- Kessler, R. C., Petukhova, M., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M., & Wittchen, H. U. (2012). Twelve month and lifetime prevalence and lifetime morbid risk of anxiety and mood disorders in the United States. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 21(3),169-184.
- Kodal, A., Fjermestad, K., Bjelland, I., Gjestad, R., Öst, L. G., Bjaastad, J. F., ... & Wergeland, G. J. (2018). Long-term effectiveness of cognitive behavioral therapy for youth with anxiety disorders. *Journal of anxiety disorders*, 53, 58-67.
- Kopala-Sibley, D. C., Mongrain, M., & Zuroff, D. C. (2013). A lifespan perspective on dependency and self-criticism: Age-related differences from 18 to 59. *Journal of Adult Development*, 20(3), 126-141.
- Leary, M. R. (1983). A brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale. *Personality and Social psychology bulletin*, 9(3), 371-375.
- McDonagh, C., Lynch, H., & Hennessy, E. (2021). Do stigma and level of social anxietypredict adolescents' help-seeking intentions for social anxiety disorder? *Early Intervention in Psychiatry*,1-5.
- Menezes, G. B. D., Coutinho, E. S. F., Fontenelle, L. F., Vigne, P., Figueira, I., Versiani, M. (2011). Second-generation antidepressants in social anxiety disorder: meta-analysis of controlled clinical trials. *Psychopharmacology*, 215(1), 1-11.

- Novy, C.(2003). Drama therapy with pre-adolescents:A narrative perspective. *Journal of the Arts in Psychotherapy*, 30 (4), 201-207.
- Norton, P. J., & Price, E. C. (2007). A meta-analytic review of adult cognitive-behavioral treatment outcome across the anxiety disorders. *The Journal of nervous and mental disease*, 195(6), 521-531.
- Orkibi, H., Azoulay, B., Regev, D., & Snir, S. (2017). Adolescents' dramatic engagement predicts their in-session productive behaviors: A psychodrama change process study. *The Arts in Psychotherapy*, 55., 46-53.
- Otto, M. W., Pollack, M. H., Gould, R. A., Worthington III, J. J., McArdle, E. T., Rosenbaum, J. F., & Heimberg, R. G. (2000). A comparison of the efficacy of clonazepam and cognitive-behavioral group therapy for the treatment of social phobia. *Journal of Anxiety Disorders*, 14(4), 345-358.
- Rapee, R. M., Gaston, J. E., & Abbott, M. J. (2009). Testing the efficacy of theoretically derived improvements in the treatment of social phobia. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 77(2), 317.
- Reghuram, R., & Mathias, J. (2014). A study on occurrence of social anxiety among nursing students and its correlation with professional adjustment in selected nursing institutions at Mangalore. *Nitte University Journal of Health Science*, 4(2), 64.
- Rudokaitė, D., & Indriuniene, V. (2019). Effectiveness of psychodrama for mitigating school fears among senior secondary school students. *Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie*, 18(2), 369-385.
- Scaini, S., Belotti, R., Ogliari, A., & Battaglia, M. (2016). A comprehensive meta-analysis of cognitive-behavioral interventions for social anxiety disorder in children and adolescents. *Journal of anxiety disorders*, 42, 105-112.
- Schry, A. R., & White, S. W. (2013). Understanding the relationship between social anxiety and alcohol use in college students: A meta-analysis. *Addictive Behaviors*, 38(11), 2690-2706.
- Şimşek, G., Yalçınkaya, E. Y., Ardiç, E., & Yıldırım, E. A. (2020). The effect of psychodrama on the empathy and social anxiety level in adolescents. *Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health*, 27(2), 96-101.
- Suryaningrum, C. (2021). College student's social anxiety: a study of the young people mental health in digital age. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 9(1), 1-10.
- Thompson, R., & Zuroff, D. C. (2004). The Levels of Self-Criticism Scale: comparative self-criticism and internalized self-criticism. *Personality and individual differences*, 36(2), 419-430.
- Treadwell, T., ED.D., TEP, CGP & Deborah Dartnell , M.A. (2017). Cognitive Behavioral Psychodrama Group Therapy. *International Journal of Group Psychotherapy*, 67(sup1), S182-S193.
- Wergeland, G. J. H., Fjermestad, K. W., Marin, C. E., Haugland, B. S. M., Bjaastad, J. F., Oeding, K., ... & Heiervang, E. R. (2014). An effectiveness study of individual vs. group cognitive behavioral therapy for anxiety disorders in youth. *Behaviour research and therapy*, 57, 1-12.
- Woody, S. R., Chambless, D. L., & Glass, C. R. (1997). Self-focused attention in the treatment of social phobia. *Behaviour Research and Therapy*, 35(2), 117-129.
- Yamaguchi, A., & Kim, M.S. (2013). Effects of Self –Criticism and Its Relationship with Depression across Cultures. *International Journal of Psychological studies*, 5(1), 74-81.
- Yüvens, B., & Üzer, A. (2018). The relationship between internet addiction, social anxiety, impulsivity, self-esteem, and depression in a sample of Turkish undergraduate medical students. *Psychiatry research*, 267, 313-318.